

KULLANILACAGI BITKİ VE YABANI OTLAR

Bitki Adı	Zararlı Organizmaya Adı	Uygulama Dozu ve Zamanı	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Aygırgeçi (Çıkış öncesi)	Kırmızı kökülü tilkikürüğü (<i>Amaranthus retroflexus</i>)	Geniş yapraklı yabancı otarda: 200 mld/a	Darıcan otuna: 300 mld/a
	Sırkeç (<i>Chenopodium album</i>)	—	Aygırgeçi ekinminde sona çıkış öncesi olarak
	Darıcan (<i>Echinocloa crus-galli</i>)	—	—
	Balılıbaba (<i>Lamium amplexicaule</i>)	—	—
	Yabani hardal (<i>Sinapis arvensis</i>)	—	—
	Kuşotu (<i>Stellaria media</i>)	—	—
	Yavşan otu (<i>Veronica spp.</i>)	—	—
Aygırgeçi (Çıkış sonrası)	Strikeç (<i>Chenopodium album</i>)	125 mld/a Çıkış sonrası yabancı otların 4-6 gerçek yaprak döneninde	49 gülə
	Yabani hardal (<i>Sinapis arvensis</i>)	—	—
Havuç	Kırmızı kökülü tilkikürüğü (<i>Amaranthus retroflexus</i>)	—	—
	Sırkeç (<i>Chenopodium album</i>)	150 ml/da	—
	Semizotu (<i>Portulaca oleracea</i>)	Havuç ekiminden sonra çıkış öncesi	—
	Yeşil kırçı darı (<i>Setaria viridis</i>)	—	—
	Yabani hardal (<i>Sinapis arvensis</i>)	olarak	—
Nohut	Eşek matulu (<i>Sonchus arvensis</i>)	—	—
	Sırkeç (<i>Chenopodium album</i>)	125 ml/da	—
	Dil kanatları (<i>Gallium aparine</i>)	Çıkış sonrası yabancı otların 2-4 gerçek yaprak döneninde	49 gün
Dikenli yabani martul (<i>Lactuca serriola</i>)	75 ml/da Çıkış sonrası yabancı otların 2-4 gerçek yaprak döneninde	—	—
Mercimek (Çıkış öncesi)	Gönlü hardal (<i>Myagrum perfoliatum</i>)	250 ml/da Mercimek ekiminden sonra çıkış öncesi olarak	—
	Yabani hardal (<i>Sinapis arvensis</i>)	300 ml/da Mercimek ekimininden sonra çıkış öncesi olarak	—

ACS DIRON ULTRA 600

Süsponsiyon Konsantre (SC)
600 g/l Aclonifen

Grubu F3,13

Herbisit (Yabancı ot İjacı)

600 g/l Aclonifen

DİKKAT

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayın.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyniz, içmeyeyniz, sigara kullanmayıymız.
- Bitki koruma ürününy uygulamamış sahaya 15 gün insan ve hayvan sokmayıniz.
- İnsan ve çevre sağlığı tizerine riskleri önlemek için, tavsiye ettiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR

Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine 1/4'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalama suyunu lağlama tankına boşaltın. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayın.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ
Genel zehirleme belirtileri görülebilir.

İL K YARDIM ÖN EMLERİ

Göz: Gözleriniz bol su ile en az 15 dakika yıkayın. Lens varsa çıkartın. Hemen doktora başvurun.

Cilt: Kontamine olmuş bütün kıyafetleri çıkartın. Etkilenen vücut kisimlarını 15-20 dakika bol su ve sabun ile iyice yıkayın. Eğer tannış belirtileri varsa ürün etiketi ile doktora başvurun.

Soluma: Hastayı temiz havaya çıkarın. Solumna güçlüğü varsa okşayan verin. Hemen doktora başvurun.

Yutma: Yutulduğu takdirde şeşenin kendisi, etiket ve mümkünense bulğu kâğıdı ile bir doktora başvurun, kusturmaya çalışmayın.

Bilinci kapalı hastaya ağızdan bir şey vermeyin. Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM)'nin 114 nolu acil durum hattını arayın ya da ambulans çağırın.

ANTİDOTO VE TEDAVİSİ
Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır.



- ZARARLILIK İFADELERİ H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
- P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
- P501: İçerijikabri Ulusal Çevre Mevzuatına göre bertaraf edin.
- EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanımına talimatlarına uyın.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT
Arılarla zehirlidir. Çiçeklenme zamanı uygulanmayın.

Balıklar için zehirlidir, yeraltı bulaşımından kaçının.

Bitki koruma ürününy ambalajında, kapalı olarak tutunuz.

Bosalan ambalajı başka maksatlar için kullanmayın ve usulüne uygun olarak inha ediniz.

DEPOLAMA DURUMU

Normal (serin ve kurut) şartlarda orijinal ambalajında ağılmadan depolandığından 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI

Firma bitki koruma ürününün etikette önerildiği şekilde zaman ve dozda uygulanıldığı takdirde etkinliğini garanti eder. Bitki koruma ürününy yanılış depolanmasından, yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zararları işte şebe olarak sömümülük kabul etmez.

SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. VE TIC. A.Ş.
Büyükelçi: Ümit Uğur BA
Tarih: 14 Ocak 2022
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENELİ MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİMLİSTİR
Başkan: Ümit Uğur BA
Sayfa 2/1

Mercimek (Çıkış sonrası)	Yabani hardal (Sırapis ärvensis)	125 mlda Çıkış sonrası yabancı olların 2-4 gerçek yaprak döneminde	49 gün
Göntülü hardal (Myagrum perfoliatum)	150 mlda Çıkış sonrası yabancı olların 2-4 gerçek yaprak		
Sarmaşık çoban değneği (Polygonum convolvulus)			döneninde

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptı bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yanıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcı çalışır durumdayken karıştırıcı depoya ilave edilir. Karıştırma işlemine edilerek depo suyu tamamlanır. Uygulama tamamlanınca kadar karıştırma işlemeye devam edilir. Dekara kullanılarak su miktarı 20-40 litre olsun, uygulamalarda yelpaze huzmeli memle kullanılmalıdır. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılmışmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarlı veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

KALİBRASYON

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkamasını sağlayınız. Yıkama işlemesini su kaynaklarının yakınında yapmayızağınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkamasını sağlayınız. Yıkama işlemesini su kaynaklarının yakınında yapmayızağınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ

ACS DIRON ULTRA 600 yaygın olarak eklilen nohut çeşidleinde (Gökce, Akgın, San-98, Menemen-92, Damla, Aydın-92, Akdeniz ve Ora, Ayadolu) güvenile kullanılabilir. Ancak Gündeveden Anadolu Bölgesinde bazı yerlerde (Diyarbakır gibi) fitotoksik olduğundan kullanılmamalıdır. Diğer çeşitlerde kullanmadan önce firmaya danışınız.

DİRENG YÖNETİMİ

ACS DIRON ULTRA 600-adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup F3,13 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direng gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direng gelişimini geciktirmek için **ACS DIRON ULTRA 600**'ün aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayızağınız. Uygulamanın tekrarlanması gereği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup F3,13 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARŞABIYRLIK DURUMU:

14 Ocak 2022

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAYIT EDILMISTIR

ACS DIRON ULTRA 600

SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. TİC. A.Ş.



ÜRETİCİ FİRMA:

GÜNER TARIMSAL MÜHENDİSLİK GIDA
HAYVANCILIK VE İNSAAT TAAHHÜT TURİZM SAN.
VE TİC. LTD STL

Bor Karma O.S.B Ankara Asfaltı 9 km 2 nolu yol 14
cd. No: 1 Bor – NIĞDE

RUHSAT SAHİBİ FİRMA:
SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. VE TİC.
A.Ş.

Büyükkayacık OSB. Mah. 103. Cad No:91
Selçuklu/KONYA
Tel: +90 444 12 83 Fax: +90 332 345 00 93

www.sectortarim.com.tr
SECTOR TARIM KİMYA GIDA PAZ. SAN. VE TİC.
Bulmakçı Mah. 103. Cad No: 91 Selçuklu/Konya
444 1283
+90 332 345 00 93
SECTOR VCD
+90 332 345 00 93
TİC. SEC. NO: 2642

